

PLOCHER-Vitalplan: Pferdeweiden & Grünland



Anwendungsempfehlungen	PLOCHER-Produkte	Dosierempfehlungen	Bemerkungen
Start im Frühjahr zur Bodenbelebung. Weitere Anwendungen: Nach Umtrieb/Schnitt/Flächenkompostierung der Nachmahd/Geilstellen	plocher humusboden me ak 7061 2 l, ak 7071 10 l	500 ml - 1 Liter/ha <i>Zur Bodensanierung: 2 l/ha</i> <i>Auf kleineren Flächen:</i> 10 - 50 ml pro 100 m ²	Vor dem Einfüllen in die Feldspritze (kleinere Flächen z. B. mit der Rückenspritze) in Wasser aufrühren. • nicht auf gefrorenem Boden • am besten vor dem Regen aussprühen
ca. 2 Wochen später auf das nachgewachsene Gras zur Förderung der Photosynthese	plocher pflanzen do/me ap 3041 2 kg, ap 3051 10 kg ap 3061 2 l, ap 3071 10 l plocher blatt-spezial me ap 3461 2 l, ap 3471 10 l	200 g bzw. ml/ha 100 ml/ha	Vor dem Einfüllen in die Feldspritze (kleinere Flächen z. B. mit der Rückenspritze) beides in Wasser aufrühren. Bei trockenem Wetter aussprühen. Spritzwassermenge: 200 - 400 l/ha

Zum Düngen: Mit plocher rotteförderung intensiv kompostierter Pferdemist (40 g/m³)

Fazit: optimiertes Wurzelwachstum, Förderung der Photosynthese, biologisch hochwertiges, schmackhaftes Grundfutter und eine trittfeste Grasnarbe

Kompostdüngung nur während der Vegetationsperiode, im zeitigen Frühjahr (ab ca. 7 °C Bodentemperatur), also nicht auf gefrorenem Boden. Die reichhaltige Kompostbiologie ist wichtig für die rasche Umsetzung und den Humusaufbau im Boden. Alternativ bzw. ergänzend sorgt im Sommer der Kompost für einen weiteren guten Aufwuchs.

