

* Nach § 18 (1) IfSG dürfen „nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die von der zuständigen Bundesoberbehörde in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt bekannt gemacht worden sind“.

Nach § 18 (2) IfSG ist die zuständige Bundesoberbehörde für die Bekanntmachung von Mitteln und Verfahren zur Entseuchung das Robert Koch-Institut.

Stand: September 2014

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?			Wie? Durchführung
		Produkt	Konz.	EWZ	
Hygienische Händedesinfektion - Personal - 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Kontakt mit Stuhl, Erbrochenem oder anderen Körperausscheidungen Nach dem Windeln und der Toilettenhilfe Nach Ablegen von Handschuhen Vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden o.ä. Vor Zubereitung von Speisen 	Sterillium® classic pure	gebr.-fertig	30 Sek.	In die trockenen Hände geben und sorgfältig über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Bei der Desinfektion gezielt die Fingerkuppen und Handflächen, insbesondere die Daumenpartien und Zwischenräume, behandeln.
Hygienische Händedesinfektion* - Personal - 	<ul style="list-style-type: none"> Bei Auftreten meldepflichtiger Viren oder Viruserkrankungen nach amtsärztlicher Anordnung 	Sterillium® Virugard	gebr.-fertig	2 Min.	
Händewaschung - Personal und Kinder - 	<ul style="list-style-type: none"> Vor Arbeitsbeginn Vor dem Essen Nach dem Toilettenbesuch, Naseputzen Bei Verschmutzung 	Baktolin® pure	gebr.-fertig		Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
Hautschutz-/pflege - Personal - 	<ul style="list-style-type: none"> Vor und nach einer die Haut belastenden Tätigkeit Insbesondere auch in Pausen und nach Arbeitsende 	Baktolan® protect*pure	gebr.-fertig		Produkt vom Handrücken in beide Hände einmassieren. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
Handschuhe - Personal - 	<ul style="list-style-type: none"> Bei möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material (Stuhl, Blut, Erbrochenem usw.) Bei Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen 	Peha-soft® nitrile white			Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
Wickeltisch 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Benutzung 	Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	Wickelaufgabe und anschl. Wickeltisch desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen. Mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) nachwischen.
Windeleimer 	<ul style="list-style-type: none"> Täglich und bei Verschmutzung 	Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	Sichtbare Rückstände entfernen. Von außen und innen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch auswischen. Dabei immer von außen nach innen arbeiten. Nicht nachtrocknen.
		Mikrobac® forte	0,5 %	1 Std.	
Fußboden, Inventar, Tische und übrige Einrichtungsgegenstände 	<ul style="list-style-type: none"> Sofort bei fäkaler Verunreinigung oder ähnlichen Kontaminationen wie Blut, Urin, Erbrochenem 	Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch Kontaminationen punktuell entfernen. Anschließend Flächen oder Gegenstände desinfizierend reinigen. Nach der Einwirkzeit alle Flächen die mit Haut oder Schleimhaut in Kontakt kommen mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) gründlich nachwischen.
		Mikrobac® forte	0,5 %	1 Std.	
Spielzeug, Krabbelbox Laufgitter 		Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	
		Mikrobac® forte	0,5 %	1 Std.	
Küchenmöbel und Geräte 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Benutzung 	Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	Flächen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch bzw. gebrauchsfertigen Einmaltuch desinfizierend reinigen. Nach der Einwirkzeit mit Trinkwasser nachwischen.
		Mikrobac® forte	0,5 %	1 Std.	
Sanitäreinrichtungen (Toiletten und Waschbecken) 	<ul style="list-style-type: none"> Täglich und bei Bedarf 	Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	Flächen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch bzw. gebrauchsfertigen Einmaltuch auswischen. Dabei immer von außen nach innen arbeiten. Nicht nachwischen.
		Mikrobac® forte	0,5 %	1 Std.	
Fieberthermometer 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Benutzung 	Bacillo® 30 Foam Bacillo® 30 Tissues	gebr.-fertig	30 Sek.	Nach der Benutzung sind die Thermometer mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abzuwischen. Vor Wiederbenutzung mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) abwischen.
Anwendung des IfSG auf der Fläche* 	<ul style="list-style-type: none"> Nach amtsärztlicher Anordnung 	Dismozon® plus	3,6 %	4 Std.	Durchführung der Wisch-Desinfektion von Personen mit entsprechender Fachkenntnis. Nach der Einwirkzeit alle Flächen die mit Haut oder Schleimhaut in Kontakt kommen mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) gründlich nachwischen.

Viruzide Produkte sind erforderlich bei Infektionskrankheiten, die durch unbehüllte Viren ausgelöst werden, wie die Hand-Mund-Fuß Krankheit oder Durchfallerkrankungen verursacht durch Noroviren.

Händedesinfektion mit **Sterillium® Virugard** (2 Min. EWZ)

Flächendesinfektion mit **Dismozon® plus** (0,4 % - 2 Std. EWZ)

Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung und die beabsichtigten Zwecke nicht aus.

Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.
Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de

