


SmartCropTechnology Anwendungsempfehlung Feldgemüse (Mengenangaben je Hektar)



PHYTO solution
... Pflanzenernährung mit System

Allgemein gilt für die Blattbehandlung:

- *Optimaler Spritzzeitpunkt: vormittags, wenn Tau abgetrocknet ist (nicht in der Mittagshitze, nicht in der Nacht).*
- *Nicht vor einem Regen spritzen (wegen Abwaschung).*
- *Netzmittel sollten bei ungünstigen Witterungsbedingungen verwendet werden.*
- *Anwendung bis einen Tag vor der Ernte möglich.*
- *Das prozentuelle Mischverhältnis muss immer gegeben sein! Bei Erhöhung der Wassermenge entsprechend auch die Produktmengen erhöhen.*



*) Aus Qualitäts- und Haltbarkeitsgründen muss VigoFol (aerobe – sauerstoffliebende – Mikroorganismen, weißliche Farbe) möglichst zeitnah zur Ausbringung geliefert werden! Bitte informieren Sie uns rechtzeitig (Lieferzeit innerhalb Österreichs: eine Woche, ins Ausland: 10 Tage)! Haltbarkeit von VigoFol (im Kanister mit integriertem Rührwerk + Belüftung): 1 Monat. Haltbarkeit der anaeroben (sauerstoffmeidenden Mikroorganismen, braune Farbe): 6 Monate; diese können für alle geplanten Blattbehandlungen auf einmal geliefert werden. Bitte alle Produkte kühl – 5 bis 20°C – und dunkel lagern.

**) Vigo-Mischung besteht aus:
- VigoSol - VigoForte Green
- VigoSol Blatt - VigoForte Plus
- VigoSol Plus