

Recupera y mejora la función eréctil en 30 días

PRELOX®

Salud endotelial, salud sexual.

Fórmula Patentada Internacionalmente

Combinación única de Pynogenol
y Aspartato de L-arginina

- Actúa sobre la microcirculación sanguínea.
- Aumenta el flujo en el área genital.
- Mejora la respuesta espontánea a la función eréctil.
- Protege los vasos sanguíneos contra la oxidación.
- No tiene efectos secundarios.


Fórmula abreviada:

Aspartato L-arginina, Pynogenol, Taurina. Estudios científicos y más de 40 análisis clínicos demuestran la eficacia de esta patente, (Irvine Vascular Laboratories and Physiology.....)

Solicite más información ampliada a comercial o visite nuestra web.
www.prelox.es



RECOMENDADO POR
URÓLOGOS



Extraído y modificado de Ledda A et al., BJU Int., 2010

PRELOX® 60 COMPRIMIDOS

Unidades caja 12 estuches

CN: 162269.3

Registro Sanitario:
RSIPAC/ 26.06807/CAT
GGSEAA/26.12776/B

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

CAMPAÑA
PUBLICITARIA
2019

AmedynHealthcare



**CUANDO LA
FUNCIÓN ERÉCTIL
ESTÁ DISMINUIDA...**

Acción sinérgica combinada de:

PYCNOGENOL®




Extracto natural rico en bioflavonoides que **potencia** la síntesis de ON (Óxido nítrico) endotelial a partir de la L-arginina¹.



L-ARGININA ASPARTATO

Aminoácido base **precursor** de la síntesis de ON.



-  Prelox® potencia la síntesis de ON
-  Prelox® relaja la musculatura lisa vascular
-  Prelox® favorece la dilatación del pene



...SE NECESITA EL
EFECTO **ON**:

PRELOX[®]
Salud endotelial, salud sexual.


Potencia la síntesis de **ON**
restaurando de forma natural
la respuesta vascular del endotelio.

Mejora la función eréctil²

PRELOX[®]
Salud endotelial, salud sexual.


EFICACIA PROBADA

ENSAYO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO Y CRUZADO EN PACIENTES CON DE MODERADA³



Prelox® mejora significativamente LA FUNCIÓN ERÉCTIL²

IIEF-Función eréctil (1-30) después de 4 semanas de tratamiento




International Index of Erectile Function, IIEF-FE (1-30): no DE (26-30 puntos), leve (17-25 puntos), moderada (11-16 puntos), grave (6-10 puntos)



 Prelox[®] mejora significativamente
LA FUNCIÓN ORGÁSMICA (IIEF-FO)²

IIEF-Función orgásmica (0-10) después de 4 semanas de tratamiento




Puntuación: 0 (mínima) – 10 (máxima) frecuencia de eyaculación y sensación de orgasmo ante una estimulación sexual durante las últimas 4 semanas



Prelox[®] mejora significativamente

SATISFACCIÓN DEL COITO (IIEF-SC)²

IIEF-Satisfacción durante el coito (0-15) después de 4 semanas de tratamiento



Puntuación: 0 (mínima) – 15 (máxima) número de intentos y satisfacción en la realización del acto sexual durante las últimas 4 semanas



Prelox® mejora la RESPUESTA SEXUAL²

Todos los pacientes en tratamiento con Prelox® indican²:

-  Erecciones matutinas más frecuentes
-  Un aumento del **deseo sexual**
-  Una mejoría en la **función eréctil** (respuesta media a los 4,9 días)
-  Un incremento de la **rapidez** en tener erecciones
-  Una mayor capacidad para **mantener** la erección durante más tiempo
-  Haber duplicado la **frecuencia** de la actividad sexual (de 4,5 a 10,9 veces de media)

Bibliografía:

1. Nishioka K, Hidaka T, Nakamura S, Umemura T, Jitsuiki D, Soga J, Goto C, Chayama K, Yoshizumi M, Higashi Y. Pycnogenol®, French Maritime Pine Bark Extract, Augments Endothelium-Dependent Vasodilation in Humans. *Hypertens Res.* 2007;30(9):775-780.
2. Stanislavov R, Nikolova V, Rohdewald P. Improvement of erectile function with Prelox: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. *International Journal of Impotence Research.* 2008;20:173-180
3. Lamm S. Prelox® for improvement of erectile function. *European endocrinology.* 2009

PRELOX®

Salud endotelial, salud sexual.

- Mejora la función eréctil²
- Eficacia probada clínicamente²
- Sin efectos secundarios^{2,3}

Modo de empleo:

- **2 comprimidos, 2 veces al día** durante dos semanas
- Continuar con **1 comprimido 2 veces al día**
- Tomar durante o después de las comidas



Ingredientes: Aspartato de L-arginina, agente de carga: celulosa, Taurina, antiaglomerante: dióxido de silicio, estabilizante: povidona, extracto de pino marítimo (Pinus Maritima: Pycnogenol®), recubrimiento: polidextrosa y cera de carnauba, antiaglomerante: estearato de magnesio, colorantes: dióxido de titanio y azul brillante FCF y carmín y rojo allura AC, agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa.

Fórmula abreviada:

Análisis	2 comprimidos	/100 g
Glúcidos	0,38 g	18,11 g
Lípidos	< 0,04 g	< 2,15 g
Proteínas	1,59 g	75,80 g
Valor energético	35 kj. [8 kcal]	1651,06 kj. [394,99 kcal]
Aspartato de L-arginina	1.400 mg	
Taurina	100 mg	
Pycnogenol®	40 mg	